

RESUME DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS POUR LES VACCINS DES VACCINS ANTIPNEUMOCOCCIQUES CONJUGUES (VPC)

Groupe vaccin¹	Vaccin antipneumococcique conjugué (VPC)			
Type vaccin¹	Antipneumococci que conjugué à 10 valences	Antipneumococci que conjugué à 10 valences	Antipneumococci que conjugué à 13 valences	Antipneumococci que conjugué à 13 valences
Sérotypes¹	1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F et 23F*	1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F et 23F*	1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F	1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F
Présentation (doses par flacon, type de conditionnement primaire, forme pharmaceutique)¹	flacon 2 doses, liquide	flacon 4 doses, liquide	flacon monodose, liquide	flacon 4 doses, liquide
Conservateur	Non	Oui	Non	Oui
Statut de préqualification par l'OMS	Préqualifié par l'OMS	Pas encore préqualifié, prévu pour la fin 2017	Préqualifié par l'OMS	Préqualifié par l'OMS
Vaccination de routine et/ou campagne	vaccination de routine	vaccination de routine	vaccination de routine	vaccination de routine
Doses pour immunisation totale	3	3	3	3
Posologie recommandée par l'OMS²	3 doses, dans un calendrier 3+0 ou 2+1	3 doses, dans un calendrier 3+0 ou 2+1	3 doses, dans un calendrier 3+0 ou 2+1	3 doses, dans un calendrier 3+0 ou 2+1
Taux de perte indicatif⁴	10 %	10 %	5 %	10 %
Volume chaîne du froid par dose (cm³)¹	4,8 cm ³	2,4 cm ³	12 cm ³	3 cm ³
Type de pastille de contrôle du vaccin¹	Type 30	Type 30	Type 30	Type 30

Durée de conservation¹	36 mois entre 2 et 8 C	36 mois entre 2 et 8 C	36 mois entre 2 et 8 C	36 mois entre 2 et 8 C
Prix 2017 par dose (US\$)³	3,05 \$	3,05 \$	3,30 \$	3,10 \$
Prix ajustés en fonction des pertes par personne totalement immunisée*	10,17	10,17	10,42	10,33
Fabricant¹	GlaxoSmithKline	GlaxoSmithKline	Pfizer	Pfizer
Nom commercial¹	Synflorix	Synflorix	Prevenar 13	Prevenar 13
Traitement des flacons ouverts¹	Pour ce vaccin, l'OMS recommande que les flacons ouverts soient jetés à la fin de la séance de vaccination ou 6 heures maximum après ouverture, selon le cas se présentant en premier.***	En attente de la confirmation de préqualification par l'OMS. Les flacons ouverts doivent être conservés pendant 28 jours, conformément à la politique de l'OMS sur les flacons multidoses.	S/O	Les flacons ouverts doivent être conservés pendant 28 jours, conformément à la politique de l'OMS sur les flacons multidoses.

1 Source : Page PQ (préqualification) du site de l'OMS : Ces pages sont mises à jour par l'OMS au fur et à mesure que de nouvelles informations sur les produits sont disponibles. Veuillez vous y reporter pour obtenir les informations les plus récentes.

2 Source : Note d'information de l'OMS : <http://www.who.int/entity/wer/2010/wer8513.pdf?ua=1>

3 Source : Préviation des prix Gavi, juin 2016

4 Source : Étude des estimations OMS des taux indicatifs de perte en vaccins, 2011

* L'Agence européenne des médicaments a formulé un avis positif sur la protection croisée contre le sérotype 19A, un type non présent dans le vaccin.

** Utilisation du taux de perte indicatif de l'OMS.

***Pour plus d'informations, se reporter à :

www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/synflorix_pqnote_2dose_2012/en/

et www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/synflorix_pqnote/en/